

## PROGRAMME DE PROPHYLAXIE POUR POULES PONDEUSES

**AVISEN Fabrique-Vente Aliment et Prémix Volaille**

AGE en SEMAINE	INTERVENTION	PROPOSITION DE PRODUITS (à titre Indicatif)	MODE D'EMPLOI
<b>1<sup>ère</sup> semaine</b>	Vaccination Influenza H9 + Newcastle	<i>Gallimune 208</i>	Injection (IM)
	Vaccination Newcastle	<i>Hb1</i>	Eau de Boisson
	Vaccination BI	<i>Bioral H120</i>	Eau de Boisson
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Aliseryl</i>	Eau de Boisson
<b>2<sup>ème</sup> semaine</b>	Vaccination Gumboro	<i>AVI IBD Iner+</i>	Eau de Boisson
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Tetracolivit</i>	Eau de Boisson
<b>3<sup>ème</sup> semaine</b>	Rappel Vaccination Gumboro	<i>Cevac IBDL</i>	Eau de Boisson
	Rappel Vaccination Newcastle	<i>AVI ND Lasota</i>	Eau de Boisson
	Rappel Vaccination BI	<i>H120</i>	Eau de Boisson
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Coliteravet</i>	Eau de Boisson
	Prévention coccidiose	<i>Amprolium</i>	Eau de Boisson
<b>4<sup>ème</sup> semaine</b>	Rappel Vaccination Gumboro	<i>Cevac IBDL</i>	Eau de Boisson
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Aliseryl</i>	Eau de Boisson
<b>6<sup>ème</sup> semaine</b>	Prévention coccidiose + Déparasitage	<i>Anticox + Levasol 20%</i>	Eau de Boisson
<b>6<sup>ème</sup> à 8<sup>ème</sup> semaines</b>	Rappel Vaccination Newcastle et Influenza H9	<i>Gallimune 208</i>	Injection (IM)
	Vaccination Variole	<i>Diftosec</i>	Transfixion alaire
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Tetracolivit</i>	Eau de Boisson
<b>8<sup>ème</sup> et 12<sup>ème</sup> semaines</b>	Vaccination Coryza + Salmonellose	<i>Cevac Corymune 4K</i>	Injection (IM)
<b>12<sup>ème</sup> et 13<sup>ème</sup> semaines</b>	Rappel Vaccination BI	<i>H120</i>	Eau de Boisson
<b>15<sup>ème</sup> et 18<sup>ème</sup> semaines</b>	Rappel Vaccination Coryza Infectieux, Newcastle, BI et Salmonellose	<i>Cevac Corymune 7K</i>	Injection (IM)
	Prévention de stress Pendant 3 jours	<i>Aliseryl</i>	Eau de Boisson

*NB : Le statut immunitaire des sujets doit être réalisé juste avant l'entrée en ponte pour les maladies de Newcastle et de la Bronchite inf. par l'envoi des prélèvements de sang au laboratoire. Déparasiter tous les 30 à 45j en alternant les produits suivis d'antistress.*